

Erhebung von Tierschutzindikatoren für Milchvieh

Name:																Betriebsnummer:				Datum:				Anzahl Kühe/Gruppe:	
managementbezogene Hinweise								tierbezogene Hinweise																	
	Gehalt somatischer Zellen	Fett-Eiweiß-Quotient	Harnstoffgehalt	Nutzungsdauer	Tierverluste	Behandlungshäufigkeiten (Euter)	Schwergeburtenrate	Totgeburtenrate	Liegeplatznutzung	Abliege- und Aufstehvorgang	Körperkondition	Klauenzustand	Hautschäden (inklusive Schwellungen)	Lahmheit	Zungenrollen										
Quelle: Wo zu finden?	MLP/MPR/ Milcherzeuger Login	MLP/ Milcherzeuger Login	MLP/MPR	MLP	MLP/Hi-Tier	sonstige Quellen	sonstige Quellen	sonstige Quellen	Beobachtung Stall	Beobachtung Stall	Beobachtung Stall	Beobachtung Stall	Beobachtung Stall	Beobachtung Stall	Beobachtung Stall										
Einheit/ Betrachtungszeitraum/ Einschätzung	Durchschnitt Monat/%	Durchschnitt Monat	Durchschnitt Monat/mg/l	Jahre	Anzahl	Anzahl/ Monat ø	halbes Jahr/ anteilig aller Geburten	halbes Jahr/ anteilig aller Geburten	Anzahl liegender ca. 3 Std. nach Fütterung	flüssige Bewegungen	zu mager normal zu fett	evtl. Klauen mit unvollständigem Bodenkontakt	Schwellungen, Verletzungen	evtl. flüssige Bewegung	Anzahl										
Ergebnis																									
Handlungsbedarf/ Maßnahmen																									
Idealerweise Erhebung zweimal jährlich jeweils Sommer und Winter																									
Aus der Vielzahl möglicher Indikatoren sollten Sie die Indikatoren auswählen, die am besten zu erheben und am aussagekräftigsten sind.																									
Empfehlung: Mindestens zwei managementbezogene und zwei tierbezogene Indikatoren auswählen und bewerten!																									